



Antidiarreico y antiséptico, indicado principalmente en caso de diarrea blanca y enteritis de los becerros y bucerros, Neumoenteritis y Disentería en ovinos y caprinos. También es usado para el tratamiento de Gastroenteritis en potros y equinos adultos. Enteritis causadas por intoxicaciones alimentarias, Enteritis parasitarias (causadas por Nematelmintos y Coccidios).

Coadyuvante en diarreas secundarias a infecciones virales.

**ESPECIE** Ovino, caprino, bufalino, caninos

**COMPOSICIÓN**

Enrofloxacina base .....2.50 g.  
 Metronidazol benzoato.....8.00 g.  
 Excipiente c.s.p .....100 ml.

**ACCIÓN FARMACOLÓGICA**

Es un antiparasitario de amplio espectro, para el control y tratamiento de las parasitosis internas de bovinos, bufalinos, equinos, ovinos y caprinos; incluyendo casos de teniasis. Incluye en su fórmula minerales con acción directa en la prevención de anemias (cobalto), y mejora en la reproducción (selenio). Su acción incluye formas maduras e inmaduras (incluyendo estadios inhibidos y huevos) de:

- Gusanos del estómago: Haemonchus spp., Ostertagia spp. y Trichostrongylus axei.
- Intestinales: Trichostrongylus spp., Coopeira spp., Nematodirus spp., Bunostomun spp., Oesophagostomun spp., Strongyloides spp., Ostertagia spp., (incluidos sus estados hipobioticos<sup>9</sup>, entre otros.
- Pulmonares: Dictyocaulus spp.,
- Tenías : Monienzia spp.,

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN** Dosis para becerros, bucerros y lechones: 0,2 ml/kg peso vivo/día, durante 5 días o más.

**CONTRAINDICACIONES**

- No se ha reportado contraindicaciones ni limitaciones de uso cuando el producto se administra en las dosis recomendadas. El producto es muy bien tolerado. Es compatible con otros antihelmínticos.
- En perros puede producir en altas dosis Vomito, anorexia y diarrea.
- No administrar conjuntamente con los derivados bromados de la salicilanilidad.
- No se recomienda su uso en animales debilitados, muy parasitados o en simultáneo con otras medicaciones, baños o vacunaciones.