



Tratamiento para reacciones alérgicas e inflamatorias agudas de carácter no infeccioso en tejido blando y musculo esquelético, estados de estrés y shock.

ESPECIE Ovinos, Caprinos, Bovinos, Porcinos

COMPOSICIÓN Dexametasona 2 mg
Excipientes C.S.P. 1 ml

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Glucocorticoide con elevada acción antiinflamatoria e inmunosupresora, de larga duración de acción, con mínimo efecto mineral corticoide. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, sustancias que median en los procesos vasculares y celulares de la inflamación, así como en la respuesta inmunológica.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Bovinos (vacunos y bufalinos), equinos, porcinos, ovinos y caprinos: 0,1 – 0,4 ml por cada 10 Kg de p.v (Vía intramuscular).
Vía intra-articular: 0.06 mg/kg.
Caninos y felinos: 0,25 – 1,5 ml por cada 10 Kg de p.v (Vía intramuscular). Vía intra-articular: 0.1 mg/kg
En casos de shock: 4-6mg/kg

No suministrar en hembras gestantes.

CONTRAINDICACIONES

- Los animales padezcan diabetes mellitus, nefritis crónica, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca u osteoporosis, a no ser que la situación sea de emergencia.
- El animal se encuentre en la fase virémica de una virosis, o ante infecciones micóticas sistémicas.
- No administrar en hembras gestantes.