



En procesos inflamatorios y dolorosos de origen traumático o infeccioso, reduce la pirexia y es usado en patologías del aparato respiratorio, genitourinario, glándula mamaria y patologías musculoesqueléticas.

**ESPECIE** Ovinos, Caprinos, Bovinos, Porcinos

**COMPOSICIÓN** Diclofenaco sódico 2,5 g  
Excipientes C.S.P. 100 ml

**ACCIÓN FARMACOLÓGICA**

El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Actúa a nivel del metabolismo del ácido araquidónico mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, responsable de la síntesis de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

Bovinos (vacunos y bufalinos): 5 ml por cada 100kg p.v. durante 1-3 días.

Porcinos: 1 ml por cada 20 kg p.v. durante 3 días.

Equinos: 5 ml por cada 100 kg p.v. durante 3-5 días.

Caprinos, ovinos, caninos y felinos: de 0.4 a 1 ml por cada 10 kg p.v.

**CONTRAINDICACIONES**

- No usar en animales que padezcan trastornos gastrointestinales, en particular en presencia de lesiones ulcerativas, ya que el diclofenaco puede agravar la sintomatología y provocar hemorragias.
- No usar en animales con disfunción hepática, cardíaca o renal ni en animales con trastornos hemorrágicos.